

Præparat	Amitriptylin & Nortriptylin
Indikation	Neuropatisk smerte (første valg ved både central og perifer)
Dosering	10-150 mg, 1 til 2 dgl.doser. Smertebehandling følger princippet "start low – go slow". Optrapningsskema udleveres.
Bivirkninger	Meget almindelige bivirkninger: Vægtøgning, hjertebanken, hurtig puls, sløvhed, søvntræng, rysten, svimmelhed, hovedpine, sløret syn og nedsat evne til at fokusere, mundtørhed, forstoppelse, kvalme, øget svedproduktion, svimmelhed/utilpashed ved pludselig ændring fra siddende/liggende til stående position, rastløshed, søvnforstyrrelse, hukommelsesbesvær og nedsat lyst til sex. Alle svinder typisk indenfor to-tre uger i de doser vi benytter.
Interaktioner	Kombination med MAO-hæmmere kan forårsage hypertensive kriser og er kontraindiceret. Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI og lithium) giver risiko for udvikling af serotonin-syndrom. Se i øvrigt pro-medicin.
Kontraindikationer	Allergisk over for amitriptylin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer. Nyligt AMI (blodprop ved hjertet). Nedsat hjertefunktion eller lider af forstyrrelser i hjertets rytme (ses på hjertekurven, EKG). Indtag af MAO-hæmmere (mod depression eller Parkinsons sygdom). Forsigtighed ved forhøjet intraokulært tryk, glaukom (grøn stær) og urinretention pga. den antikolinerge virkning.
Særlige forholdsregler	Ved alder over 65 år max 50 mg/dg, betydelige sedative, kardielle og antikolinerge bivirkninger og faldrisiko. Se "IRF Rød-gul-grøn" EKG tages før start af behandling.
Analgetisk effekt indtræder	Den smertelindrende effekt af amitriptylin begynder efter 3 – 5 dage. Den fulde smertestillende virkning indtræder først efter 2 – 4 ugers behandling.
Evidens; NNT & NNH	Stærk evidens. NNT omkring 4. NNH omkring 20
Referencer	IRF "Neuropatiske smerter"; IRF "Rød-gul-grøn"; (begge Teamsite) samt Promedicin.dk, Indlaeggelsessedel.dk, Medicinkombination.dk