

Præparat	NSAID
Smertemodalitet	NSAID har plads i behandling af nociceptive smerter, men i sær i den akutte smertebehandling. Særligt anvendes NSAID i gigtbehandling. Primær søges behandling med paracetamol.
Dosering	Maksimaldosis alders afhængig: Ibuprofen (2400 mg i højst 4 uger), diclofenac (200 mg) og naproxen (1000 mg i 4 dage)
Bivirkninger	Nyrepåvirkning, væskeretention - se i øvrigt det enkelte præparat. Diclofenac tabletter er ikke rekommanderet på Den Nationale Rekommandationsliste pga. højere kardiovaskulær risiko end fx ibuprofen ved selv kortvarig behandling
Interaktioner	Warfarininteraktion giver øget blødningsrisiko Risiko for cerebral blødning ved kombination med antidepressiva
Kontraindikationer	Mavesår, AMI, Nyreinsufficiens, Leverinsufficiens – se det enkelte præparat Antitrombotisk behandling af enhver art.
Særlige forholdsregler	Dosis og bivirkninger skal sammenholdes med smertelindringen og ved utilstrækkelig effekt , toleransudvikling eller generende uacceptable bivirkninger bør opioidrotation overvejes
Effekt indtræder	Hurtigt – men varierende – se det enkelte præparat
Evidens; NNT & NNH	Stærk
Referencer	IRF "Rød-gul-grøn"; (begge Teamsite) samt Promedicin.dk, Indlaeggelsessedel.dk, Medicinkombination.dk.